



# COVID-19 治療

重症化予防に役立てることができる新薬

米国食品医薬品局はCOVID-19を治療するためのさまざまな治療薬の緊急使用許可を承認または発行しました。この薬は、症状が軽度から中等度で、COVID-19が重症化するリスクが高い人が対象です。この薬は、医師または薬剤師による処方箋が必要です。処方される薬に応じて、治療は症状が現れてから5日または7日以内に開始する必要があります。

リスクが高く、陽性となった場合、すぐに医療提供者に連絡し、COVID-19の治療があなたに適しているかどうか尋ねてください。

詳細については、  
[hawaiiicovid19.com/treatment](https://hawaiiicovid19.com/treatment) をご覧ください。



## 治療内容

一部の治療は経口投与されます。その他は点滴静注によって投与されます。

抗ウイルス薬はCOVID-19の特定の部分を標的とし、ウイルスが正しく複製するのを防ぎます。



## 対象者は誰ですか？

COVID-19の重症化リスクが高い人は、治療薬の候補になります。これには、ワクチン未接種、体重過多/肥満、65歳以上の方、心臓・肺・肝臓・腎臓疾患のある方、糖尿病、妊娠、認知症、がん、ぜんそく、障害、物質使用障害、精神障害のある方などが含まれます。



## 予防医学

COVID-19の感染を防ぐために、曝露前投薬があります。中等度から重度の免疫不全の方への処方箋があれば使用できます。

COVID-19の治療はCOVID-19防接種に代わるものではありません。すべての人にできるだけ早く予防接種を受けることが推奨されています。

詳細については、  
[aspr.hhs.gov/COVID-19/Therapeutics](https://aspr.hhs.gov/COVID-19/Therapeutics) をご覧ください。